Infecciones en ancianos institucionalizados



ALMA

Cartagena, 2009

INTRODUCCIÓN





Presentación de la Situación

“Las instituciones de cuidado”







EPIDEMIOLOGÍA

- 1 a 3 infecciones por año

Riesgo multifactorial de infección



Origen de la infección Intra-institucional



Multi-resistencia



Causas de Multi-resistencia en cuidado crónico

Evaluación de infecciones en instituciones

Infectious Diseases Society of America,
Society for Healthcare Epidemiology of America
American Geriatrics Society.

- **Funcionalidad**
- **Adecuada toma de muestras**
- **Ancianos + comorbilidad**

2000 J Am Geriatr Soc 57:375–394, 2009

1. En quién sospechar infección?

- Deterioro en el estado funcional (IIB) **o**
- Fiebre (IIIB)



Quién hace la primera aproximación?


2. Qué hacer?



- Examen físico completo / Registrar
- **Directrices avanzadas**
- Paraclínicos:

Institución vs. traslado (IIIB)

3. Cuáles paraclínicos, sin foco claro?



3. Cuáles paraclínicos?

Leucopenia?

Cuadro hemático

Con o sin Fbº…

NO Leucocitosis > 14.000 (IIIB)

NO Desviación a la izquierda (IIIB)

NO Infección

3. Cuáles paraclínicos?

“Tirilla” (IIIB)

b. Uroanálisis

- Asintomático: NO (IA)
- Sin Catéter: CON SXS. (IIA)
- Con catéter: UROSEPSIS (IIA)

3. Cuáles paraclínicos?


Funcionalidad?

Bacteremia
IIB


c. Hemocultivos

NO (IIB)

4. Cuando tengo foco claro, qué…?



4. Cuando tengo foco claro qué…?




Neumonía en pacientes institucionalizados

Clasificación de las neumonías:

- Neumonía adquirida en la comunidad
  - Neumonía asociada a ventilador
    - Neumonía intrahospitalaria
      - Neumonía institucional

Sociedad americana de tórax


THE NEXT TO GO
FIGHT TUBERCULOSIS!
Red Cross Christmas Seal Campaign

4. Cuando tengo foco claro qué…?

Infección respiratoria alta

Muestras nasofaríngeas (IIIA)




4. Cuando tengo foco claro, qué…?

Infección mucocutánea



IIIB

Toma de muestra



IIB


Clínica?

4. Cuando tengo foco claro, qué…?

Infección mucocutánea (2)



IIIA




IIIB



IIIB

4. Cuando tengo foco claro, qué…?



Infección mucocutánea



Emergentes



4. Cuando tengo foco claro, qué…?



Gastrointestinal

<7 días estable

Colitis

Observación IIIB

C. Difficile IIA
Salmonella

> 7 días estable

Parasitosis

Autonomía vs. No maleficencia



recomendaciones/conclusiones

1. Vacunación del personal
2. -educación continuada (JAGS 2007)

